

グルベス[®]を服用される患者さんへ

グルベス[®]配合錠

錠剤(原寸大)



PTPシート(縮小)

表



裏



グルベス[®]配合OD錠



食後の急激な血糖の上昇を抑え、血糖値を下げる糖尿病の薬です。本薬の服用により低血糖症状を起こすことがあります。以下の点にご注意ください。

また、この注意は、必ず家族やまわりの方にも知らせてください。

●服薬のタイミングは?

- ・食事の直前(食事前5分以内)にお飲みください。
- ・服用後は必ず食事をとってください。

●食事前に飲み忘れたときには?

- ・その回の服用は避けてください。
- ・2回分を一度にまとめて服用しないでください。
- ・食後や空腹時に服用しないでください。

●低血糖症状が起こったら?

- ・糖分の吸収を遅らせる成分が含まれていますので、砂糖ではなく、必ず**ブドウ糖**をお飲みください。
- ・常にブドウ糖を携帯してください。
- ・がまんせずに、早めにブドウ糖をとってください。

(裏面もご覧ください)

低血糖症状と予防について

●低血糖症状とはどのような症状?



脱力感・
異常な空腹感



イライラする



頭痛・頭が重い・
めまい



意識を失う



手足のふるえ



冷汗・動悸

●低血糖を起こさないためには?

- ・薬は正しく飲みましょう。グルベスは必ず食事の直前に飲んでください。
- ・食事をとる時間の遅れ、激しい運動、空腹時の運動は避けてください。

- ・低血糖の徴候を放っておくと、さらに症状が進み、けいれんを起こしたり、意識を失うことがあります。低血糖症状を起こした場合は、必ず早めに主治医に報告してください。
- ・高所作業や自動車の運転などの危険を伴う機械を操作しているときに、低血糖症状を起こすと事故につながるおそれがあります。特に注意してください。

