

リザベン[®]点眼液0.5%を 使用される患者さまへ

「リザベン点眼液0.5%」って、どんなお薬？

目がかゆい、涙が出る…など、
『アレルギー性結膜炎』の症状を
改善するお薬です。

【アレルギー性結膜炎の原因物質】

- スギやヒノキなどの「春」の花粉
- カモガヤやバタクサなどの「初夏から秋」の花粉
- ダニ、室内のほこり（ハウスダスト）、ペットの毛 など



ボトル底部の色調が濃く見えますが、それは側面との厚みに差があるためです。

いつ使えばいいの？

1回1～2滴を1日4回、
朝・昼・夕方・就寝前に
点眼してください。

※医師・薬剤師の指示に従って、
規則正しくお使いください。

保存方法は？

遮光袋に入れ、
室温で保存してください。
(冷蔵庫に入れてはいけません)



正しい点眼方法は？


点眼前は

まずは、
必ず手を洗おう！



点眼時は

容器の先端が、
まぶたや目の縁に
触れないように！



複数の
点眼薬を
使う時は

5～10分程度の間隔をあけてから、
次の点眼薬を使おう！



点眼

点眼

点眼

※点眼する順番は医師・薬剤師の指示に従ってください。



点眼後、体調の変化等がみられましたら、医師・
薬剤師にご相談ください。