

ユリーフ®を服用される患者さまへ

監修：東京通信病院 名誉院長 河邊 香月

Q ユリーフはどのようなお薬ですか？

「前立腺肥大症に伴う排尿障害」を改善するお薬です。

前立腺は年齢とともに徐々に大きくなり、

「おしっこの勢いが弱い」

「おしっこが出にくい」

「トイレが近い」

「夜中に何度もトイレに起きる」

などの症状が現れます。

ユリーフは、このような症状を改善するお薬です。



Q ユリーフにはどのような副作用がありますか？

ユリーフの主な副作用

- 射精時の精液量が少なくなる（射精障害）
- 立ち上がったときにふらつく（ふらつき、めまい、立ちくらみ※）
- 便がやわらかくなる（下痢、軟便）
- 口の中が渇く（口渇）
- 鼻がつまる（鼻閉）

※ 高所作業や自動車の運転などの危険を伴う作業に従事される方は、主治医にご相談ください。



もし気になる症状が現れた場合には、主治医にご相談ください。

Q 射精障害とはどのようなものですか？


射精障害とは精管、精囊せいのおう、膀胱頸部(膀胱出口)の収縮が抑えられるため、射精時の精液が減少したり出なくなる現象で、勃起障害(ED)ではありません。また、健康に害を及ぼすものではありません。

Q 射精障害が起こったときに注意することはありますか？

射精時の精液量の減少以外に症状はありません。服用中または休薬により回復します。ただし子どもを望む場合や、精液量の減少が気になる患者さまは、主治医にご相談ください。

Q その他、服用にあたって注意することはありますか？

白内障などの眼科手術を受ける予定がある場合は、眼科の先生にユリーフを服用していることをお伝えください。



医療機関名