


ウテメリン錠 5mg を処方された方へ

ウテメリン錠5mg (ⓀUTの記号が入っている白い錠剤)は、おなかのはりや下腹部の痛みをとり、子宮の状態を正常に保って流産や早産への進行をおさえるお薬です。

以下の注意事項をまもってのみましましょう。

—わからないこと、不安なことがあれば、医師・薬剤師にご相談ください—

- 1 ▶ お薬は、食事の後に忘れずにのみましましょう。**
- 2 ▶ 副作用が心配な場合は、医師に相談しましょう。**
人によっては、以下の症状が出ることがあります。
症状が強くなる時には、医師に相談してください。
 - 動悸(心臓がドキドキする)がする
 - 脈が速くなったように感じられる
 - 顔が赤くなる
 - 手が震える
- 3 ▶ お薬を処方されている間は、安静を心がけましょう。**
このお薬が処方されている間は流産や早産の危険があると考えられ、安静にすることが大切です。
とくにお薬をのんだ後は、30分くらい、横になって休みましょう。
- 4 ▶ 赤ちゃんや子供が誤ってお薬を口に入れないようお薬は、お子さんの手の届かない所に保管しましょう。**



ウテメリン錠5mg PTPシート裏面にはQRコードが印刷されています。スマートフォンやタブレットPCを用いてこれにアクセスすると、ウテメリン錠のおくすり情報、妊娠中の生活における注意点、母体と胎児の変化等についての情報をご覧いただけます。

