

# 再審査結果のお知らせ

2026年4月

高リン血症治療剤

**ピートル<sup>®</sup>チュアブル錠 250mg**

**ピートル<sup>®</sup>チュアブル錠 500mg**

**P-TOL<sup>®</sup> Chewable Tablets 250mg**

**P-TOL<sup>®</sup> Chewable Tablets 500mg**

スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

**ピートル<sup>®</sup>顆粒分包 250mg**

**ピートル<sup>®</sup>顆粒分包 500mg**

**P-TOL<sup>®</sup> Granules 250mg**

**P-TOL<sup>®</sup> Granules 500mg**

スクロオキシ水酸化鉄顆粒

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること。

キッセイ薬品工業株式会社

この度、標記製品につきまして、令和8年3月11日付 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知（医薬薬審発 0311 第1号）にて、再審査結果が公示されました。

本剤は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第14条の4第4項の規定による再審査が終了し、同第14条第2項（承認拒否事由）第3号イからハのいずれにも該当しない（カテゴリー1）と判断されたこと及び「効能又は効果」、「用法及び用量」に変更がないことをお知らせいたします。

再審査結果の詳細は、PMDA ホームページに掲載されている「再審査報告書」をご参照いただきますようお願い申し上げます。

[https://www.pmda.go.jp/drugs\\_reexam/2026/P20260226001/230034000\\_22700AMX01010\\_A100\\_1.pdf](https://www.pmda.go.jp/drugs_reexam/2026/P20260226001/230034000_22700AMX01010_A100_1.pdf)

効能又は効果	透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善
用法及び用量	通常、成人には、鉄として1回 250mg を開始用量とし、1日3回食直前に経口投与する。以後、症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日 3000mg とする。



**キッセイ薬品工業株式会社**

松本市芳野19番48号

問い合わせ先：くすり相談センター

フリーダイヤル 0120-007-622