

「医薬品の封の取扱い等について」 に関する情報の弊社ホームページ掲載についてのご案内

平成30年8月1日付で厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医薬品の封の取扱い等について」（薬生発0801第1号）を受け、弊社製品の封に関して、目視等で開封の有無を確認できる方法に関する情報を弊社医療関係者向けホームページに掲載することとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社製品の封は、「テープ封緘」および「糊封緘」の2種類に大きく分けられます。さらに「テープ封緘」は「テープ封緘（引き開けるタイプ）」と「テープ封緘（押し開けるタイプ）」の2種類に分けられ、「糊封緘」は「糊封緘（引き開けるタイプ）」、「糊封緘（押し開けるタイプ）」および「糊封緘（ジッパータイプ）」の3種類に分けられます。それぞれ以下の弊社製品を例として掲載いたします。

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 1-① テープ封緘（引き開けるタイプ） | ➡ 『ピートル顆粒分包250mg』 |
| 1-② テープ封緘（押し開けるタイプ） | ➡ 『シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」』 |
| 2-① 糊封緘（引き開けるタイプ） | ➡ 『ユリーフ錠2mg』 |
| 2-② 糊封緘（押し開けるタイプ） | ➡ 『リザベンカプセル100mg』 |
| 2-③ 糊封緘（ジッパータイプ） | ➡ 『ガスコン錠80mg』 |

また、各包装の開封方法を一覧表にして掲載しておりますのでご参照ください。

1-① テープ封緘（引き開けるタイプ）

例：ピートル顆粒分包250mg

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

① 未開封の状態



② 開封方法



③ 開封後の状態



- ① ミシン目が切れていないこと、社名入封緘テープがしっかり貼付されていることを確認してください。
- ② 開封口に指をかけて、手前側に引き開けてください。

注意 以下の場合はずでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている場合



再封されている場合
（「開封済」が表示されている）



封緘テープが切れている場合



1-② テープ封緘（押し開けるタイプ） 例：シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

① 未開封の状態



② 開封方法



③ 開封後の状態



- ① ミシン目が切れていないこと、社名入封緘テープがしっかり貼付されていることを確認してください。
- ② 開封口を指で内側に押し、上へ引き開けてください。

注意 以下の場合はずでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている場合



再封されている場合
（「開封済」が表示されている）



封緘テープが切れている場合



2-① 糊封緘（引き開けるタイプ）

例：ユリーフ錠2mg

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

① 未開封の状態



② 開封方法



③ 開封後の状態



- ① ミシン目が切れていないこと、開封口がしっかり糊付けされていることを確認してください。
- ② 開封口に指をかけて、外側へ引き開けてください。

注意 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている場合



再封されている場合



※一部「開封済」表示のある製品がございます。

2-② 糊封緘（押し開けるタイプ） 例：リザベンカプセル100mg

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

① 未開封の状態



② 開封方法



③ 開封後の状態



- ① ミシン目が切れていないこと、側面がしっかり糊付けされていることを確認してください。
- ② 開封口を指で内側に押し、外側へ引き開けてください。

注意 以下の場合はずでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている場合



2-③ 糊封緘（ジッパータイプ） 例：ガスコン錠80mg

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

① 未開封の状態



② 開封方法



③ 開封後の状態



- ① ミシン目が切れていないこと、側面がしっかり糊付けされていることを確認してください。
- ② 開封用のジッパー加工を端まで引き開けてください。

注意 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている場合



各包装の開封方法 一覧表

| 製品名 | 包装 | 開封方法 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| ウテメリン錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウテメリン注50mg | 10アンプル | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 50アンプル | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用25μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用50μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用100μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用150μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用200μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用250μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ウパシタ静注透析用300μgシリンジ* | 1mL[10シリンジ] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| エポエチンアルファBS注750「JCR」 | 10バイアル | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ガスコン錠40mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠[10錠(PTP)×100] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠 [アルミラミネート袋、バラ] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| ガスコン錠80mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠[10錠(PTP)×100] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠 [アルミラミネート袋、バラ] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| ガスコン散10% | 100g[アルミラミネート袋、バラ] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| | 1kg[アルミラミネート袋、バラ] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| ガスコンドロップ内用液2% | 300mL | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| カピステン筋注50mg | 10アンプル | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| | 50アンプル | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| カログラ錠120mg* | 336錠 [8錠(PTP)×21シート×2ピロー] | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |
| グルファスト錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| グルファスト錠10mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| グルファストOD錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| グルファストOD錠10mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |

| 製品名 | 包装 | 開封方法 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ゲルバス配合錠 | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1050錠[21錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ゲルバス配合OD錠 | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| サビーン点滴静注用500mg | 1バイアル | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| サラジェン顆粒0.5% | 84g[1g×84包] | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |
| サラジェン錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 | 60錠[10錠(PTP)×6] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 | 60錠[10錠(PTP)×6] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」 | 20錠[10錠(PTP)×2] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」 | 20錠[10錠(PTP)×2] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| | 100錠[10錠(PTP)×10] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ゾラデックス1.8mgデボ | 1筒 | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ダクチル錠50mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠[10錠(PTP)×100] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| タバリス錠100mg | 60錠[10錠(PTP)×6] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| タバリス錠150mg | 60錠[10錠(PTP)×6] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| タブネオスカプセル10mg* | 60カプセル [6カプセル(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 1シリンジ | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 1シリンジ | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 10シリンジ | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 1シリンジ | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 1シリンジ | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 1シリンジ | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| デスマプレシン点鼻液0.01%協和 | 1瓶 | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| デスマプレシン・スプレー2.5協和 | 1瓶 | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| デスマプレシン・スプレー10協和 | 1瓶 | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| デスマプレシン注4協和 | 10管 | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |
| ドプラム注射液400mg | 1バイアル | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| | 5バイアル | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |

| 製品名 | 包装 | 開封方法 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ドメナン錠100mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ドメナン錠200mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg「キッセイ」 | 14カプセル [14カプセル(PTP)×1] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| | 140カプセル [14カプセル(PTP)×10] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ピートルチュアブル錠250mg | 84錠[6錠(PTP)×14] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ピートルチュアブル錠500mg | 84錠[6錠(PTP)×14] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ピートル顆粒分包250mg | 84包 | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 420包 | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |
| ピートル顆粒分包500mg | 84包 | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 420包 | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |
| フラグミン静注5000単位/5mL | 10バイアル | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| フルスタン錠0.15 | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| フルスタン錠0.3 | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ベオーバ錠50mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| ベザトールSR錠100mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ベザトールSR錠200mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠[10錠(PTP)×100] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 1000錠[アルミラミネート袋、バラ] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| マリゼブ錠12.5mg | 10錠[2錠シート(患者さん用パッケージ付きPTP)×5] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| マリゼブ錠25mg | 20錠[2錠シート(患者さん用パッケージ付きPTP)×10] | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| ミニリンメルトOD錠25μg | 100錠 [10錠(ブリスターシート)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ミニリンメルトOD錠50μg | 100錠 [10錠(ブリスターシート)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ミニリンメルトOD錠60μg | 100錠 [10錠(ブリスターシート)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 100錠 [10錠(ブリスターシート)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 100錠 [10錠(ブリスターシート)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |

| 製品名 | 包装 | 開封方法 |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ユリーフ錠2mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[プラスチックボトル、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ユリーフ錠4mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[プラスチックボトル、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ユリーフOD錠2mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[プラスチックボトル、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ユリーフOD錠4mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 2-①(糊封緘・引き開けるタイプ) |
| | 500錠[プラスチックボトル、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」 | 2.5mL×5本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| | 2.5mL×10本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| リザベンカプセル100mg | 100カプセル [10カプセル(PTP)×10] | 2-②(糊封緘・押し開けるタイプ) |
| | 500カプセル [10カプセル(PTP)×50] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| リザベン細粒10% | 120g [アルミラミネート袋、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| リザベンドライシロップ5% | 120g [アルミラミネート袋、バラ] | 1-②(テープ封緘・押し開けるタイプ) |
| リザベン点眼液0.5% | 5mL×5本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ)* |
| | 5mL×10本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ)* |
| リズモンTG点眼液0.25% | 2.5mL×5本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| | 2.5mL×10本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| リズモンTG点眼液0.5% | 2.5mL×5本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| | 2.5mL×10本 | 2-③(糊封緘・ジッパータイプ) |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 30.8g/缶×4本 | 1-①(テープ封緘・引き開けるタイプ) |