

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2018年12月

緑内障・高眼圧症治療剤

# リズモン<sup>®</sup>TG 点眼液0.25%

# リズモン<sup>®</sup>TG 点眼液0.5%

〔チモロールマレイン酸塩製剤〕

販売元 **キッセイ薬品工業株式会社**  
松本市芳野19番48号

製造販売元 **わかもと製薬株式会社**  
東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。  
なお、流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）			改訂前		
<b>3. 相互作用</b> (中略) <b>併用注意（併用に注意すること）</b>			<b>3. 相互作用</b> (中略) <b>併用注意（併用に注意すること）</b>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
オミデネバグ イソプロピル	結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻度の上昇が認められた。	機序不明	アドレナリン、ジピペフリン塩酸塩	散瞳作用が助長されたとの報告がある。	
アドレナリンジピペフリン塩酸塩	散瞳作用が助長されたとの報告がある。	機序不明	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)			

### 2. 改訂理由

○自主改訂

類薬に準じて、下記内容について注意喚起致します。

相互作用相手薬の記載と整合性を図るため、「3. 相互作用」併用注意の項に、オミデネバグ イソプロピルとの併用に関する記載を追記致しました。

また、同項におけるアドレナリン、ジピペフリン塩酸塩の薬剤名等および機序・危険因子の記載整備を行いました。

添付文書の改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)及び医薬品安全対策情報(DSU)に掲載されます。併せてご利用ください。